

استارتر گوساله فرزنانگان



با توجه به اینکه تغذیه و رشد مناسب گوساله ها در مدیریت مناسب گله گاو های شیری اهمیت بسزایی دارد و با توجه به سعی دامداران برای از شیر گیری هر چه سریعتر گوساله ها ، تکامل سریع دستگاه گوارش به خصوص شکمبه با تغذیه درست و مناسب گوساله اهمیت بسزایی دارد.

همچنین در زمان مصرف خوراک استارتر پلت پاییلار های شکمبه رشد کامل تری خواهند داشت. تحقیقات نشان داده حضور باکتری ها در شکمبه ، مصرف مناسب مایعات توسط حیوان ، آغاز حرکات دستگاه گوارش و نفوذ پذیری غشا در گرو شروع استفاده از خوراک جامد در گوساله ها می باشد. گوساله ای که از نرخ رشد مناسبی برخوردار باشد میتواند در سن تلقیح به وزن و جثه مناسب برسد و با کمترین مشکل اولین زایمان خود را انجام دهد و تبدیل به گاو شیری پر توان در گله گردد.

- ☒ افزایش وزن بدن
- ☒ بهبود ضریب تبدیل
- ☒ کاهش دوره شیردهی
- ☒ افزایش خوراک مصرفی



میزان	واحد	آنالیز مواد
۱/۳۱	MCal/Kg	NEG
۲/۹-۳	MCal/Kg	ME
۲۱±۱	%	پروتئین
۱۴/۵	%	فیبر
۵/۹۹	%	کلسیم
۵/۵۶	%	فسفر
۱۰±۱	%	رطوبت
۱۰۰۰۰۰۰	IU/Kg	ویتامین A
۳۰۰۰۰	IU/Kg	ویتامین D
۵۰۰۰	IU/Kg	ویتامین E
به میزان لازم	-	ویتامین های B

- ☒ حاوی مواد مغذی با قابلیت جذب بالا
- ☒ بهبود سیستم ایمنی و مقاومت بدن
- ☒ بهبود و توسعه دستگاه گوارش
- ☒ بهبود یکنواختی رشد گله

توصیه می‌گردد در زمان مصرف استارتر :

- * تلاش نمایید که آب به مقدار کافی در اختیار گوساله قرار گیرد.
- * ظروف استارتر به طور کامل پر نشود و همواره استارتر تازه در اختیار گوساله قرار گیرد.
- * مصرف استارتر را از روز سوم تولد به صورت آزاد همراه با شیر مادر یا شیر جایگزین آغاز نمود.
- * همیشه خوراک استارتر همراه با 5 % علوفه در اختیار گوساله قرار گیرد